Critères d'exclusion d'un enfant d'un milieu de garde ou d'un milieu scolaire

L'enfant fait-il de la **fièvre*** le matin à la maison ?

Oui → Exclure l'enfant du milieu. Il doit rester à la maison.

Non ↓

L'enfant développe-t-il de la **fièvre*** à l'école ?
OU
L'enfant de **moins de 3 mois** développe-t-il de la **fièvre*** en milieu de garde ?
OU
Si l'enfant de **3 mois et plus** développe de la **fièvre*** en milieu de garde, **lui donner, si indiqué, de l'acétaminophène selon le protocole.**
Est-ce que la **fièvre*** est toujours présente **1 heure après** ?

Oui → Exclure l'enfant du milieu. Il doit rester à la maison.

Non ↓

L'enfant a-t-il des symptômes qui pourraient suggérer une **maladie sévère** OU son **état de santé** l'empêche-t-il de suivre les activités du groupe ou empêche-t-il la personne responsable de s'occuper adéquatement des autres enfants ?

Oui → Exclure l'enfant du milieu. Il doit rester à la maison.

Non ↓

L'enfant a-t-il eu **2 vomissements** ou plus dans les dernières 24 heures ?

Oui → Exclure l'enfant du milieu. Il doit rester à la maison.

Non ↓

L'enfant a-t-il eu des épisodes de **diarrhée** trop abondante pour être contenue dans la couche OU contenant du sang ou du mucus OU l'enfant est-il incontinent (incapable de se rendre à la salle de bain) ?

Oui → Exclure l'enfant du milieu. Il doit rester à la maison.

Non ↓

L'enfant a-t-il des **lésions cutanées avec écoulement purulent** (pus) qui ne peuvent pas être couvertes par un pansement imperméable (mis à part l'écoulement d'un œil lié à une conjonctivite) ?

Oui → Exclure l'enfant du milieu. Il doit rester à la maison.

Non ↓

L'enfant a-t-il **obtenu un diagnostic** médical accompagné d'une indication d'être exclu temporairement du milieu ?

Oui → Exclure l'enfant du milieu. Il doit rester à la maison.

Non ↓

Il n'est pas nécessaire d'exclure l'enfant.
Surveillez son état de santé et rehaussez les pratiques de base telles que l'hygiène des mains, l'hygiène et l'étiquette respiratoires ainsi que le nettoyage et la désinfection des objets, des surfaces et des locaux.

En aucun temps, cet outil ne doit remplacer une consultation avec un professionnel de la santé et les consignes associées au diagnostic posé.

Exclure l'enfant du milieu.
Il doit rester à la maison.

Le retour sera permis lorsque toutes les conditions suivantes s'appliqueront :

- **Absence de fièvre*.**
- **L'état général de l'enfant** lui permet de suivre les activités du groupe et ne requiert plus ou peu de soins additionnels.
- **Aucun vomissement** depuis 24 heures.
- **Si épisode de diarrhée :** Les selles peuvent être contenues dans la couche ou l'enfant est continent. Absence de sang et de mucus dans les selles diarrhéiques.
- **Si présence de lésions cutanées avec écoulement purulent :** Absence d'écoulement, lésions croûtées ou possibilité de les couvrir avec un pansement imperméable.
- **Si exclu à la suite d'un diagnostic ou d'une consultation médicale :** Accord du médecin pour le retour dans le milieu.

*** Définition de la fièvre :**

Enfant de moins de 3 mois :
- 38,0 °C et plus (rectum)

Enfant de 3 mois et plus :
- 38,5 °C et plus (rectum ou oreille)
- 38,0 °C et plus (bouche)
- 37,5 °C et plus (aisselle)

La température **par le rectum est plus fiable** chez les enfants de 5 ans et moins.

Adapté d'une production de la Direction régionale de santé publique de Montréal

23-284-02W

Votre gouvernement

Québec